



الصفحة
1
3



الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة الاستدراكية 2011
الموضوع

7	المعامل	RS22	الرياضيات	المادة
3	مذلة الإدجار	شعبة العلوم التجريبية بمسالكها وشعبة العلوم والتكنولوجيات بمسلكها		الشعب(ة) أو المفصل

معلومات عامة

- يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة ؛
- مدة إنجاز موضوع الامتحان : 3 ساعات ؛
- عدد الصفحات : 3 صفحات (الصفحة الأولى تتضمن معلومات والصفحتان المتبقيتان تتضمنان تمارين الامتحان)؛
- يمكن للمترشح إنجاز تمارين الامتحان حسب الترتيب الذي يناسبه ؛
- ينبغي تفادي استعمال اللون الأحمر عند تحرير الأجوبة ؛
- بالرغم من تكرار بعض الرموز في أكثر من تمرين ، فكل رمز مرتبط بالتمرين المستعمل فيه ولا علاقة له بالتمارين السابقة أو اللاحقة .

معلومات خاصة

يتكون الموضوع من أربعة تمارين مستقلة فيما بينها و تتوزع حسب المجالات كما يلي :

النقطة الممنوحة	المجال	التمرين
2.5	حل معادلات ومتراجحات أسية نبرية	التمرين الأول
4	الأعداد العقدية	التمرين الثاني
3.5	المتتاليات العددية	التمرين الثالث
10	دراسة دالة وحساب التكامل	التمرين الرابع

- بالنسبة للتمرين الرابع ، \ln يرمز لدالة اللوغاريتم النبري .

الموضوع

التمرين الأول (2.5 ن)

- (1) أ - حل في \mathbb{R} المعادلة : $x^2 - 2x - 3 = 0$ 0.5
 ب - حل في \mathbb{R} المعادلة : $e^x - \frac{3}{e^x} - 2 = 0$ 1
 (2) حل في \mathbb{R} المتراجحة : $e^{x+1} - e^{-x} \geq 0$ 1

التمرين الثاني (4 ن)

- (1) حل في مجموعة الأعداد العقدية \mathbb{C} المعادلة : $z^2 - 6z + 18 = 0$ 1
 (2) نعتبر ، في المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر (O, \bar{u}, \bar{v}) ، النقطتين A و B .
 أ - اكتب على الشكل المثلثي كل من العديدين a و b 0.5
 ب - بين أن b' لحق النقطة B' صورة النقطة B بالإزاحة التي متجهتها \overline{OA} هو 6 0.75
 ج - بين أن : $\frac{b-b'}{a-b'} = i$ ثم استنتج أن المثلث $AB'B$ متساوي الساقين وقائم الزاوية في B' 1
 د - استنتج مما سبق أن الرباعي $OAB'B$ مربع 0.75

التمرين الثالث (3.5 ن)

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بما يلي : $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \frac{6u_n}{1+15u_n}$ لكل n من \mathbb{N} .

- (1) أ - تحقق من أن : $u_{n+1} - \frac{1}{3} = \frac{u_n - \frac{1}{3}}{15u_n + 1}$ لكل n من \mathbb{N} 0.5
 ب - بين بالترجع أن : $u_n > \frac{1}{3}$ لكل n من \mathbb{N} 0.5
 (2) نعتبر المتتالية العددية (v_n) المعرفة بما يلي : $v_n = 1 - \frac{1}{3u_n}$ لكل n من \mathbb{N} 1.5
 بين أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{6}$ ثم اكتب v_n بدلالة n
 (3) بين أن $u_n = \frac{1}{3 - 2\left(\frac{1}{6}\right)^n}$ لكل n من \mathbb{N} ثم استنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ 1

التمرين الرابع (10 ن)

- I - نعتبر الدالة العددية g المعرفة على $I =]0, +\infty[$ بما يلي : $g(x) = x - 1 + \ln x$
- (1) أ - بين أن $g'(x) = \frac{x+1}{x}$ لكل x من I 0.5
ب - بين أن الدالة g تزايدية على I 0.5
- (2) استنتج أن $g(x) \geq 0$ على $[1, +\infty[$ وأن $g(x) \leq 0$ على $]0, 1]$ (لاحظ أن $g(1) = 0$) 1
- II - لتكن f الدالة العددية المعرفة على I بما يلي : $f(x) = \left(\frac{x-1}{x}\right) \ln x$
- (1) أ - بين أن $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ وأول النتيجة هندسيا 0.75
ب - بين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ (لاحظ أن $\frac{f(x)}{x} = \left(\frac{x-1}{x}\right) \frac{\ln x}{x}$ لكل x من I) 1
ج - استنتج أن المنحنى (C) يقبل فرعا شلجيميا بجوار $+\infty$ يتم تحديد اتجاهه 0.5
- (2) أ - بين أن $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ لكل x من I 1
ب - استنتج أن الدالة f تزايدية على $[1, +\infty[$ و تناقصية على $]0, 1]$ 0.5
ج - أعط جدول تغيرات الدالة f على I 0.25
- (3) أنشئ (C) (نقبل أن للمنحنى (C) نقطة انعطاف وحيدة أفصولها محصور بين 1,5 و 2) 1
- (4) أ - بين أن $H : x \mapsto \frac{1}{2}(\ln x)^2$ دالة أصلية للدالة $h : x \mapsto \frac{\ln x}{x}$ على المجال I 0.5
ب - بين أن $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2}$ 0.75
ج - باستعمال مكاملة بالأجزاء بين أن $\int_1^e \ln x dx = 1$ 1
- (5) أ - تحقق من أن $f(x) = \ln x - \frac{\ln x}{x}$ لكل x من I 0.25
ب - بين أن مساحة حيز المستوى المحصور بين المنحنى (C) ومحور الأقطاب والمستقيمين اللذين معادلتهما $x=1$ و $x=e$ هي : 0.5 cm^2 0.5