

ب. احتمال إصابة الحميل III₄ بالمرض :

Page 2 / 6

II2

الأبوان:

المظهر الخارجي: [M] [M]

النمط الوراثي: M/m M/m

3

الأمشاج: m/½ M/½ m/½ M/½

شبكة التزاوج:

الإشراج	M 1/2	m 1/2
M 1/2	(M/M)	(M/m)
	[M] 1/4	[M] 1/4
m 1/2	(M/m)	(m/m)
	[M] 1/4	[m] 1/4

0.5

0.5

0.25

احتمال إصابة الحميل III₄ بمرض Mucoviscidose هو ¼

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2017 - عناصر الإجابة

NR 32

4

مادة: علوم الحياة والأرض - شعبة العلوم التجريبية مسلك علوم الحياة والأرض

0.5

4

0.25

Page 2 / 6

0.5

1

0.5

0.25

2

0.25

0.25

0.5

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

الأبوان: III x II2

المظهر الخارجي: [M] [M]

النمط الوراثي: M/m M/m

3

0.5

0.5

0.25

0.25

0.25

احتمال إصابة الحميل III₄ بمرض Mucoviscidose هو ¼

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2017 - عناصر الإجابة

NR 32

3

4

مادة: علوم الحياة والأرض - شعبة العلوم التجريبية مسلك علوم الحياة والأرض

0.5

0.5

0.5

4

أ. تردد التحليل المسؤول عن المرض : $f(m/m) = 1/2500 = q^2$

$f(m) = q = \sqrt{q^2} = \sqrt{1/2500} = 0.02$

0.5

0.5

0.5

ب. تردد الأفراد السليمين الناقلين للمرض : $f(M) = p = 1 - q = 0.98$

$f(M/m) = 2pq = (0.98 \times 0.02) \times 2 = 0.0392$

0.5

0.5

0.5

التمرين الثالث (3 نقط)

Page 3 / 6

1 - الأباء من سلالتين نقيتين حسب لون العيون، والجدات من سلالتين نقيتين حسب لون الجسم؛ والحليل المسؤول عن لون العيون الأرجوانية سائد على الحليل المسؤول عن لون العيون الفاتحة.

2 - تعطيل ارتباط المورثتين:

3 - تفسير الصبغي لنتائج التزاوج الثاني:

4 - حساب المسافة الفاصلة بين المورثتين المدروستين يتم حساب نسبة المظاهر الخارجية جديدة التركيب والتي تساوي 28.66% وبالتالي فالمسافة الفاصلة بين المورثتين هي 28.66 cMg.

5 - وضع الخريطة العاملية:

6 - موراثة لون العيون

7 - موراثة لون الجسم

8 - 28.66 cMg

9 - Page 4 / 6

10 - Page 5 / 6

Page 3 / 6

1 - الأباء من سلالتين نقيتين حسب لون العيون، والجدات من سلالتين نقيتين حسب لون الجسم؛ والحليل المسؤول عن لون العيون الأرجوانية سائد على الحليل المسؤول عن لون العيون الفاتحة.

2 - تعطيل ارتباط المورثتين:

3 - تفسير الصبغي لنتائج التزاوج الثاني:

4 - حساب المسافة الفاصلة بين المورثتين المدروستين يتم حساب نسبة المظاهر الخارجية جديدة التركيب والتي تساوي 28.66% وبالتالي فالمسافة الفاصلة بين المورثتين هي 28.66 cMg.

5 - وضع الخريطة العاملية:

6 - موراثة لون العيون

7 - موراثة لون الجسم

8 - 28.66 cMg

9 - Page 4 / 6

10 - Page 5 / 6

التمرين الرابع (3 نقط)

ظروف تواجد العينات الصخرية :	العينات الصخرية		
	A	B	C
المعمق (Km)	≈120	≈140	≈220
درجة الحرارة (C°)	1000	400	800

1
 + المجالات: تنتمي العينة الصخرية B إلى المجال 4، وتنتمي العينة C إلى المجال 1.....
 + التحقق من الفرضيتين: تنتمي الصخرتان B و C إلى مجالين تكون فيهما الصخور في الحالة الصلبة (S) وبالتالي لا يمكن أن تتكون فيهما الصهارة ، إذن فالفرضيتان 2 و 3 غير صحيحتين.....

2
 + المجال: تنتمي الصخرة A إلى المجال 2.....
 + التحقق من الفرضية: في هذا المجال تخضع صخرة البيريدونيت المميبة لاصهار جزئي (S + L) مما يؤكد صحة الفرضية [.....]
 + الشرط الضروري: حدوث الانصهار الجزئي لصخرة البيريدونيت يستلزم وجود الماء.....

3
 + تفسير التغيرات العيدانية:
 ينتج عن انقراض الغلاف الصخري المحيطي في منطقة الطمر ارتفاع مهم في الضغط بالإضافة إلى الارتفاع في درجة الحرارة مما يؤدي إلى :
 - حدوث التفاعل [فتتحول الصخرة R1 مكونة من البلاجيوكلاز و الكلويفان.
 - حدوث التفاعل 2 فتتحول الصخرة R2 المكونة من البلاجيوكلاز و الكلويفان لتعطي الصخرة R3 المكونة من الجاديب و البجادي
 + استنتاج أصل الماء:
 ينتج الماء اللازم لتشكيل الصهارة عن التفاعلين العيدانيين 1 و 2 التي تخضع لهما صخور القشرة المحيطية المنغرفة نتيجة ارتفاع الضغط ودرجة الحرارة.....