





| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|--|---|---|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|
| الصفحة 4 | الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المدورة العادية 2010 الموضوع | | |  وزارة التربية والتعليم والبيئة والشباب والرياضة مركز تطوير تكوين وابرام اتفاقيات | | | | | | | | | | | | |
| 5 | المعامل: | NS34 | علوم الحياة والأرض | المساحة: | | | | | | | | | | | | |
| 3 | مدة الاجاز: | شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية | | الشعب (5) أو المسلك: | | | | | | | | | | | | |
| التمرين الأول (5 نقط) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>يودي كل من النشاط الصناعي والنشاط الفلاحي والأنشطة المرتبطة بالاستهلاك المنزلي إلى تلوث المياه العذبة السطحية والجوفية.</p> <p>بين من خلال عرض واضح ومنظم كيف تؤدي هذه الأنشطة إلى تلوث هذه المياه، مع تحديد الملوثات الناجمة عن كل نشاط وإبراز الآثار السلبية لهذه الملوثات على الصحة وعلى البيئة.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| التمرين الثاني (5 نقط) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>نقترح دراسة صفتين وراثيتين عند الأرانب ترتبطان بلون وطول الزغب، ومن أجل ذلك نقدم المعلومات الآتية:</p> <p>١- يتوفر أحد مرببي الحيوانات على سلالتين نقيتين من الأرانب، تختلفان بصفتين وراثيتين تتعلقان بمورثتين مستقلتين: لون الزغب وطول الزغب. تتوفر حيوانات السلالة الأولى على زغب بني وقصير، بينما تتوفر حيوانات السلالة الثانية على زغب أسود وطويل.</p> <p>أراد العربي الحصول على سلالة ندية من الأرانب ذات زغب أسود وقصير. في مرحلة أولى أنجز تزاوجاً أول بين السلالتين النقيتين الأصليتين فحصل على النتائج المبينة في الوثيقة ١.</p> <p>في مرحلة ثانية أنجز تزاوجاً ثانياً بين أفراد الجيل F₁ فحصل على جيل F₂.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>١ - أعط التفسير الصيغي لنتيجة التزاوج الأول، ثم حدد نسب مختلف المظاهر الخارجية المتوقعة في الجيل F₂ مستدلاً بشكّة التزاوج. (2 ن)</p> <p>(استعمل الرموز L و E بالنسبة لصفة طول الزغب، والرموز N و n بالنسبة لصفة لون الزغب).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>٢ - بناءً على هذه النتائج بين، معللاً إجابتك، أن العربي لا يمكنه عزل السلالة المرغوبة (سلالة ندية ذات لون أسود وزغب قصير) تماماً من مظهرها الخارجي فقط، واقتصر تزاوجاً يُمكنه من عزل هذه السلالة مع تحديد النتائج المتوقعة. (٥,١ ن)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 10px;">  <p>ذكر من سلالة ندية ذات زغب أسود وطويل</p> <p>أنثى من سلالة ندية ذات زغب بني وقصير</p> <p>F₁</p> <p>١٠٠% من الأرانب ذات زغب أسود وقصير</p> </td> <td style="text-align: center; padding: 10px;"> <p>سلالة من الصنف الهيمني</p>  </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center; padding: 5px;"> في وسط درجة حرارته 20°C، تبقى درجة حرارة الجسم عند الأرانب ثلاثة تقريباً في 39°C، باستثناء أرجلها وذيلها وأنفها التي تصبح درجة حرارتها تقريباً 33°C. </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center; padding: 5px;"> الوثيقة 2 </td> </tr> </table> | | | | |  <p>ذكر من سلالة ندية ذات زغب أسود وطويل</p> <p>أنثى من سلالة ندية ذات زغب بني وقصير</p> <p>F₁</p> <p>١٠٠% من الأرانب ذات زغب أسود وقصير</p> | <p>سلالة من الصنف الهيمني</p>  | في وسط درجة حرارته 20°C، تبقى درجة حرارة الجسم عند الأرانب ثلاثة تقريباً في 39°C، باستثناء أرجلها وذيلها وأنفها التي تصبح درجة حرارتها تقريباً 33°C. | | | | | الوثيقة 2 | | | | |
|  <p>ذكر من سلالة ندية ذات زغب أسود وطويل</p> <p>أنثى من سلالة ندية ذات زغب بني وقصير</p> <p>F₁</p> <p>١٠٠% من الأرانب ذات زغب أسود وقصير</p> | <p>سلالة من الصنف الهيمني</p>  | | | | | | | | | | | | | | | |
| في وسط درجة حرارته 20°C، تبقى درجة حرارة الجسم عند الأرانب ثلاثة تقريباً في 39°C، باستثناء أرجلها وذيلها وأنفها التي تصبح درجة حرارتها تقريباً 33°C. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الوثيقة 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>٢- لإبراز العلاقة صفة - بروتين نقترح دراسة صفة لون الزغب عند سلالتين من الأرانب، سلالة متواضعة ذات مظاهر أسود وسلالة من الصنف الهيمالي ذات مظاهر أمّيق، نقدم المعلومات الآتية:</p> <p>تبين الوثيقة 2 مظاهر هاتين السلالتين من الأرانب بعد وضعهما في وسط درجة حرارته 20°C.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

يرجع اللون الأسود للأرانب إلى صبغة الميلاتين الموجودة في الزغب. يتم تركيب هذه الصبغة في عدة مراحل انتطلاقاً من الحمض الأميني التiroزين. يدخل في هذا التركيب عدة أنزيمات من بينها إنزيم التiroزيناز الضروري لتحول التiroزين إلى المركب Dopa، قرين الوثيقة 3 أصل اللون الأسود للزغب عند هذه الأرانب:



- عند السلالة من الصنف المتوحش يكون إنزيم التiroزيناز نشطاً في درجة حرارة 33°C وفي درجة حرارة 39°C.
- عند السلالة من الصنف الهيماليبي يكون إنزيم التirozيناز نشطاً في درجة حرارة 33°C ، لكنه يصبح غير نشطاً (غير فعال) عندما ترتفع درجة الحرارة فوق 33°C.
- لا تتأثر الأنزيمات الأخرى، المتداخلة في تركيب الميلاتين، بهذه التغيرات في درجة الحرارة عند السلالتين.



الوثيقة 3

3- باستغلال معطيات الوثائق 2 و 3، وضع العلاقة صفة بروتين. (1,5 ن)

التمرين الثالث (5 نقاط)

1- يتطلب النشاط العضلي وجوداً مستمراً لجزيئات ATP التي تمد الخلية العضلية بالطاقة اللازمة لتنفسها. تحديد طرق تحديد هذه الجزيئات من طرف الخلية العضلية نقدم المعطيات الآتية:

| كمية الطاقة المستهلكة خلال مجهود عضلي بـ kJ | كمية الطاقة المقابلة لهذا التركيز بـ kJ | تركيز ATP في العضلات بـ mM | الوثيقة 1 |
|---|--|----------------------------------|----------------|
| 35 | 7.5 | من 5.1 إلى 180 | من 120 إلى 180 |



1- باستغلال معطيات الوثيقة 1 بين ضرورة التجدد المستمر لجزيئات ATP داخل العضلات. (1 ن)

2- تبين الوثيقة 2 الشكل (أ) تطور تركيز كل من الحمض اللبني والfosfocreatine وجزيئات ATP خلال الجري السريع لمسافة 100m، وبين الشكل (ب) من نفس الوثيقة تطور استهلاك ثاني الأكسجين خلال مجهود عضلي لمدة طويلة.



2- صف نتائج القياسات المنجزة بشكلي الوثيقة 2، واستنتج المسالك الاستقلالية المتداخلة في تجديد ATP. (1,75 ن)

II- تلعب الميتوكوندريات دوراً أساسياً في تركيب ATP داخل الخلايا، ولتحديد بعض شروط إنتاج ATP داخل هذه الخصائص نعتمد على المعطيات التجريبية الآتية:

- التجربة الأولى: تم تحضير عالميتوكوندريات غني بمركبات مختزلة $\text{NADH} + \text{H}^+$ و FADH_2 و خل من الأوكسجين، وتم تتبع تطور تركيز H^+ وإنتاج ATP في الوسط في الفروف التجريبية الآتية: في الزمن t_1 أضيف للوسط محلول غني بالأوكسجين، وفي الزمن t_2 أضيفت مادة FCCP وهي مادة تجعل الغشاء الداخلي للميتوكوندري تفواً لآيونات H^+ . تبين الوثيقة 3 (الشكل 1) النتائج المحصلة.


- التجربة الثانية: وضعت ميتوكوندريات في وسط غني بالأوكسجين، وتم تتبع تركيزه في الوسط بعد إضافات متتالية لمجموعة من المواد. تبين الوثيقة 3 (الشكل 2) المعطيات التجريبية والنتائج المحصل عليها.

تبين الوثيقة 4 مواقع تأثير المواد المستعملة في التجربتين الأولى والثانية على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري.



3- يالاستعنة بمعطيات الوثيقة 4 وبتوظيف مكتسباتك، أربط العلاقة بين تطور تركيز H^+ في الوسط وإنتاج ATP بين الزمنين t_1 و t_2 و توقفه بعد الزمن t_2 (الوثيقة 3 الشكل 1)، ثم فسر تطور تركيز الأوكسجين في علاقة t_1 و t_2 بالميتوكوندري (الوثيقة 3 الشكل 2). (2,25 ن)

التمرین الرابع (5 نقط)




يفترض الباحثون أن الطواهر الجيولوجية التي أدت إلى تكون سلسلة جبال الهيمالايا تجمع بين الطواهر الجيولوجية التي أدت إلى تكون سلسلة جبال الأنديز والتي أدت إلى تكون سلسلة جبال الألب.

التحقق من هذا الافتراض فتقرح دراسة الوثائق الآتية:


الوثيقة 1: مقطع يمثل سلسلة جبال الأنديز بالبيرو.

| | | |
|-------------|------|---|
| الصفحة 4 | NS34 | الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2010 - الموضوع - مادة: علوم الحياة والأرض - شعبة العلوم التجريبية سلك العلوم الفيزيائية |
|-------------|------|---|

الوثيقة 2: مجسمين مبسطين لمنطقتين من مسلسل الاصطدام: سلسلة جبال الألب وسلسلة جبال الهيمالايا.



- 1- لكل من سلسلة جبال الأندز وجبال الألب وجبال الهيمالايا مميزات بنوية وصخرية خاصة. استخرج من المقاطع الجيولوجية لكل من الوثيقة 1 وشكل 2 المميزات الخاصة بكل سلسلة من هذه السلسلتين الجبلية. (2,25 ن)




بعض الأمفيبولييت صخرة متولدة منتشرة بسلسل الاصطدام وختى بعدن الأمفيبولييت الذي يشكل ذاكرة لظروف الضغط ودرجة الحرارة التي كانت سائدة خلال مراحل تكون الصخرة. لاسترداد هذه الظروف نقدم المعطيات الآتية:

تمكن تحاليل كيميائية أجريت على نقط محددة في معادن الأمفيبولييت من تحديد قيمة الضغط ودرجة الحرارة التي كانت سائدة أثناء تشكيل هذه المعادن. تبين الوثيقة 3 موقع التحاليل على مستوى الصفيحة النافية لصخرة الأمفيبولييت، وتبين الوثيقة 4 قيمة الضغط ودرجة الحرارة المقابلة لمواقع التحاليل.

| موقع التحليل في معادن الأمفيبولييت | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| G | F | E | D | C | B | A |
| 5,6 | 6,2 | 7,5 | 8,0 | 8,8 | 5,6 | 4,0 |
| Kb | | | | | | |
| 450 | 510 | 570 | 660 | 620 | 410 | 320 |
| درجة الحرارة بـ °C | | | | | | |

ملحوظة: تم تكوين معادن الأمفيبولييت في مراحل متالية غير الزمن من A نحو G.

الوثيقة 4



- 2- صف التطور المتزامن لكل من الضغط ودرجة الحرارة المسجل في معادن الأمفيبولييت. (0,5 ن)

تقدم الوثيقة 5 مجالات سحداث التحول حسب الضغط ودرجة الحرارة.

- 3- حدد من خلال هذا المبيان السخونة والعمق اللذان تكُون فيهما كل من المواقع A وD وG، وبناء على هذا التحديد وعلى معطيات الجدول بين مسار تشكيل معادن الأمفيبولييت. (1,25 ن)

- 4- اعتماداً على معطيات الوثائق السابقة وبنظرية مكتسبةك أعط سلسلة الأحداث التي أدت إلى تكون سلسلة جبال الهيمالايا، مبيناً أن هذه السلسلة تختزن الأحداث التي مررت منها كل من سلسلة جبال الأندز وجبال الألب. (1 ن)