

الصفحة 5	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2014 الموضوع F.B	المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المركز الوطني للتقدير والامتحانات والتوجيه NS 34
3	علوم الحياة والأرض	المادة
5	العامل	العنصر أو المركب

يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير المبرمجة
(التمرين الأول (5 نقط))

تعتبر تقنية إنتاج السماد العضوي وتقنية إنتاج غاز الميثان وتقنية الترميد المصحوب بإنتاج الطاقة من أهم الطرق المستعملة في التقنيات من حجم النفايات المنزلية وإعادة استعمال المواد العضوية.


من خلال نص واضح ومنظم:

- عزف كل تقنية من هذه التقنيات. (0,75 ن)
- أصل التأثير الإيجابي لكل تقنية من هذه التقنيات الثلاث على البيئة. (2,25 ن)
- بين إيجابيات كل تقنية من التقنيات الثلاث على المستوى الاقتصادي. (2 ن)

(التمرين الثاني (5 نقط))

تعتبر العضلة في نشاطها على جزيء ATP التي يبنيها باستمرا، يظهر في حالات مرضية نادرة، عند بعض الأشخاص، ضعف عضلي وعياء شديد مع ارتفاع تركيز الحمض البولي في الدم (Acidose lactique) (Acidose lactique) عند الاشخاص المصابة بهذا المرض، نفترض المعطيات الآتية:


- بعد استخلاص الميتوكتريات من الانسجة المختلطة المصابة (واذا كان في كل الميتوكتريات) لشخص يعاني من هذا المرض وأخرى من الاف شخص سليم، تم تحضير عالقين للميتوكتريات غبيتين بثاني الأوكسجين (O_2)، ثم أضيفت لكل عالق معيطي الإلكترونات TH_2 الذي يحول $NADH+H^+$ إلى NAD^+ وتم تغير تركيز O_2 في كل منها.
- بين الشكل (أ) من الوثيقة 1 الناتج المقصودة وبين الشكل (ب) من نفس الوثيقة جزءاً من الغشاء الداخلي للميتوكتري يقسم نوافل الإلكترونات والإلكترونات وتتدفق هذه الأخيرة من المقطعي الأول $NADH+H^+$ إلى المقطعي النهائي O_2 ، وذلك على مستوى ميتوكتري عادي.




1. قارن تطور نسبة ثاني الأوكسجين في كل من عالق ميتوكتريات الشخص المصابة، وعالق ميتوكتريات الشخص السليم. (ن 0.75)
2. فسر، مستعينا بالشكل (ب)، تغير نسبة O_2 الملاحظ في عالق ميتوكتريات الشخص السليم. (1 ن)


الصفحة 5	NS 34	F.B	الموضوع ـ مادة : علوم الحياة والأرض ـ ـ عصبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية
-------------	-------	-----	--

- مكن قياس نشاط نوافل السلسلة التقاعدية في ميتوكتريات الاليف / اعتماداً عليه من الحصول على الناتج المبين في الوثيقة 2 تتمثل الوثيقة 3 خطاطة ميسطة لمراحل اكسدة الكاليلوكوز داخل الخلايا العضلية في مسلكي التنفس والتلخمر البولي عند شخص سليم.



1. استخرج من الوثيقة 2 الحال الذي أصاب ميتوكتريات الشخص المصابة. (0.25 ن)
2. اربط العلاقة بين معطيات الوثائقين 2 و 3 واستعن بالشكل (ب) من الوثيقة 1 لتفصير سبب ارتفاع تركيز الحمض البولي في دم الشخص المصابة وتفصير ضعف تجديد ATP. (1.5 ن)
3. لعلاج الحال الذي تعاني منه ميتوكتريات الاليف العضلية المصابة اقترح الباحثون استعمال مانتي Ménadione و Ascorbate.
4. وللتتأكد من نجاعة هذا الاقتراح، تم قياس قدرة العضلات المكانية للشخص المصابة على تجديد ATP بعد مسجدة عضلي. وبين الشكل (أ) من الوثيقة 4 نتائج هذا القياس، وبين الشكل (ب) من نفس الوثيقة تغير مانتي Ménadione و Ascorbate على السلسلة التقاعدية.






3. أ - فاز نظور تركيز ATP عند الشخص المصابة بعد العلاج وعند الشخص المصابة بدون علاج (الشكل (أ)).
ب - مستعيناً بالشكل (ب) من الوثيقة 4، فسر نظور تركيز ATP في الألياف العضلية المصابة بعد العلاج (ن).


التقرير الثالث (5 نقاط)

لإزار العلاقة صفة - بروتين ومورثة - بروتين وفهم كيفية انتقال بعض الصفات الوراثية نقترح المطاعط الآتية:
I - تتميز الأرانب المتوحشة (أ) بفرو داكن وتتميز الأرانب من سلالة الأرانب الهيمالي (ب) Lapin himalayen (F.B)
أبيض باستثناء بعض مناطق الجسم التي تكون داكنة (نهاية القوام والأذن والذيل). عند إزالة الفرو للأرانب الهيمالي ووضع هذا الأرنب في وسط درجة حرارته 15°C طيلة فترة تجديد فروه، يظهر الفرو الجديد كله داكنًا مثل فرو السلالة المتوحشة.


ملحوظة: للإشارة درجة حرارة جسم الأرنب هي 37°C.



- لفهم العلاقة بين لون الفرو عند الأرانب الهيمالي ودرجة حرارة الوسط، نقترح المطاعط الآتية:
• ينتج لون الفرو الداكن عن وجود مادة الميلانين التي يتم ترتيبها حسب سلسلة التفاعلات الممثلة في الوثيقة 1 :



- تم استخلاص إنزيم التيروزيناز من خلايا فرو أرنب هيمالي، ووضع هذا الإنزيم في أنابيب 1 و 2 يحتويان على نفس التركيز من التيروزين:
 - وضع الأنابيب 1 في وسط ذي درجة حرارة ثابتة تساوي 36°C؛
 - وضع الأنابيب 2 في وسط ذي درجة حرارة ثابتة تساوي 30°C.
- تم استخلاص إنزيم التيروزيناز من خلايا فرو أرنب متوازن، ووضع هذا الإنزيم في أنابيب 3 و 4 يحتويان على نفس التركيز من التيروزين:
- وضع الأنابيب 3 في وسط ذي درجة حرارة ثابتة تساوي 36°C.
 - وضع الأنابيب 4 في وسط ذي درجة حرارة ثابتة تساوي 30°C.
- بعد ذلك تم تتبع نظرة التيروزين في هذه الأنابيب. يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 2 النتائج المحصلة، ويمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة البنية الجزيئية لإنزيم التيروزيناز للأرانب الهيمالي في 30°C وفي 36°C.



1. باستغلال مطاعطات الشكليات (أ) و (ب) من الوثيقة 2 وبتوظيف مطاعطات الوثيقة 1، فسر سبب ظهور الفرو الداكن في بعض مناطق الجسم عند الأرانب الهيمالي. (1.5 ن)
- لتوضيح سبب تأثير البنية الجزيئية لإنزيم التيروزيناز بدرجات حرارة 30°C و 36°C على التركيز (Page 5) من الوثيقة 3، تمثل الوثيقة 4 مسخراً جانبياً جدول الرمز البريدي.

1	2	3	4	5	6	7
...CAG AAA AGT GTG ACA TTT GCA...						
1	2	3	4	5	6	
...CAG AAA AGT GAC ATT TGC A...						

جزء من اللولب غير المستنسخ لمورثة التيروزيناز عند أرنب متوازن (الحليل المتوازن)
جزء من اللولب غير المستنسخ لمورثة التيروزيناز عند أرنب هيمالي (الحليل الطافر)

الوثيقة 3

الوثيقة 4

2. باستغلال الوثقيتين 3 و 4، أعط ممتاليتي الأحماض الأمينية المطابقة لكل من الحلبل المتوازن والحلبل الطافر، ثم فسر سبب تأثير لون الفرو بدرجة حرارة الوسط عند الأرانب الهيمالي. (1.5 ن)


Cys	Ser	Val	Ala	Ile	Thr	Gln	Asp	Phe	Lys
UGU	AGU	GUU	GCU	AUU	ACC	CAA	GAU	UUU	AAA
UGC	AGC	GUC	GCC	AUC	ACA	CAG	GAC	UUC	AAG

1	2	3	4	5	6	7
...CAG AAA AGT GAC ATT TGC A...						
1	2	3	4	5	6	

التمرين الرابع (5 نقط)


قصد تحديد الخصائص العدينية والبنوية للصخور المتحولة وعلاقتها بالكلينيتية، وربطها بالظروف الجيوفيزانية السائدة في القشرة الأرضية أثناء تشكيل هذه الصخور، فنقرح المعطيات الآتية:

- تمثل الوثيقة 1 خريطة جيولوجية مبسطة لمنطقة Sud-Limousin بفرنسا توضح مجالات ظهور بعض المعادن المنشورة في بعض صخور المنطقة.
- تمثل الأشكال (أ) و (ب) و (ج) من الوثيقة 2 رسوماً تخطيطية لصفائح دقيقة لكل من الميكايشيس (العينة A) والغانياس (العينة B) والميكمايت (العينة C).



الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2014 - الموضوع
- مادة : علوم المياه والأرض - هيئة العلوم التجريبية مملكة العلوم الفيدرالية

- يمكن التكrib العديني للصخور المتحولة من تحديد ظروف الضغط ودرجة الحرارة التي تشكلت فيها هذه الصخور.
تمثل الوثيقة 3 تموير الصخور A و B و C حسب ظروف الضغط ودرجة الحرارة.



1. أـ. حدد التغيرات العدينية للصخور عند الانتقال من X إلى Y حسب المقطع XY الممثل في الوثيقة 1. (0.5 ن)

بـ. صف بنية كل صخرة من الصخور A و B و C الممثلة في الوثيقة 2. (1.5 ن)

2. انطلاقاً من الوثيقة 3:

أـ. بين كيف يتغير عامل الضغط ودرجة الحرارة عند الانتقال من الصخرة A إلى الصخرة B ثم إلى الصخرة C. (0.5 ن)

بـ. بين أن صخور هذه المنطقة خضعت لتتحول تدريجي من الميكايشيس إلى الغانياس، وحدد نمط هذا التحول. (0.75 ن)

3ـ. اعتماداً على المعطيات السابقة وعلى مكتسباتك، فسر كيف تشكل كل من الميكمايت والكرانيت في منطقة Sud Limousin. (1.75 ن)

